



# COVID-19 खोप र रगत जम्ने तपाईंको खोपको बारेमा जानकारी

34 मिलियन भन्दा बढी मानसिहरूलाई खोप लगाएर तथा 10,000 भन्दा बढी मानसिहरूको जीवन रक्षा गरेर बेलायत खोप कार्यक्रम अत्यन्तै सफल भएको छ। द्रुत रोलआउटको अर्थ हामीले धेरै मानसिहरूको सुरक्षा गर्न सक्षम भएका छौं र हामीले आफ्नो नागरिक माथलिगाईएको प्रतबिन्ध हटाउन थालेका छौं। यो पर्चा तपाईंलाई खोपको बारेमा सूचित जानकारी गर्न सघाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो।

## चिन्ता के हो?

हालै खोप लगाईसकेपछि रगत जम्ने र असामान्य रुपमा रक्तस्राव सहितको एउटा अत्यन्त दुर्लभ अवस्थाको बारेमा रिपोर्टहरू प्राप्त भइरहेको छ। यसलाई सावधानीपूर्वक समीक्षा गरिरहेको छौं तर यस्तो अवस्थाको लागि जोखिमका कारकहरू अझै प्रष्ट भएको छैन।

यद्यपि यो अवस्था अत्यन्त दुर्लभ भए पनि मानसिहरूमा एस्ट्रजेनेका (AZ) खोपको पहिलो डोज लगाएको लगत्तै यस्तो हुनसक्ने उच्च जोखिम हुनसक्छ। AZ खोपको खुराक दिइएका प्रत्येक मिलियन खुराकमा झण्डै 4 जनामा यस्तो अवस्थाको विकास हुन्छ।

यो युवा व्यक्तिहरूमा अलबिढी देखिन्छ र खोप लगाएको 4 दिन देखि 2 हप्ताको बीचमा हुन्छ।

यो अवस्था प्राकृतिक रूपमा पनि हुन सक्छ, र रगत जम्ने समस्या COVID-19 संक्रमणको एउटा साझा जटिलता हो। अहिले सम्म बढ्दो जोखिम देखिएको छैन।

## मलाई कुन खोप दिइनेछ ?

अहिले सम्म हामीले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई कुनै प्राथमिकता बिना हामीले प्रस्ताव गर्ने हाम्रा सबै खोपहरूमा भर परेका थियौं। खोप र प्रतिक्रियाको संयुक्त समिति (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) ले जोखिम र लाभहरूको सन्तुलनलाई मनन गरेको छ र अब निम्न सल्लाह दिएको छ (आगामी पृष्ठहरूमा थप विवरण हेर्नुहोस्)।

## 40 वर्ष वा बढी वा अन्तर्नहिति चिकित्सा अवस्थाहरू भएका

वृद्ध वयस्कहरू (40 वर्ष वा बढी उमेरका स्वास्थ्य र सामाजिक स्याहारकर्मीहरू सहित), केयर होमका वासनिदाहरू र नशिचति चिकित्सा अवस्थाहरू भएका कुनै पनि उमेरका वयस्कहरू COVID-19 को जटिलताको उच्च जोखिममा छन् । औषधिहरू र स्वास्थ्य स्याहार उत्पादनहरूको नियामक एजेन्सी (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) र JCVI ले तपाईंलाई अझै उपलब्ध कुनै पनि COVID-19 खोपहरू लानिपर्छ भनेर सल्लाह दिएको छ ।\* COVID-19 ले तपाईंलाई कुनै पनि जोखिमका गम्भीर परिणामहरू वरिद्ध दानि तपाईंको सुरक्षाको लाभ यसको कुनै पनि अत्यन्त दुर्लभ अवस्थाको जोखिमभन्दा बढी हुन्छ ।

## यदि तपाईं 30 देखि 39 वर्षको स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने

हालको अवस्थामा JCVI ले यो उमेर समूहका मानसिहरूलाई AZ बाहेक अन्य खोप लगाउनु राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिएको छ । तपाईं COVID-19 को गम्भीर परिणामहरूको बढी जोखिममा हुनुहुन्छ र यदि तपाईं वृद्ध, पुरुष, केही अल्पसंख्यक जातीय पृष्ठभूमिबाट, केही पेशाहरूमा, वा मोटोघाटो हुनुहुन्छ भने खोप लगाएमा धेरै फाइदामा हुनुहुनेछ । तपाईंको रक्षा गर्नको लागि र भाइसको जोखिमको सम्भावना कम गर्नको लागि जितसिक्दो चाँडो यो खोप लगाउन जरुरी छ । यदि परिस्थिति परिवर्तन भएमा र तपाईंलाई AZ खोपको प्रस्ताव दिएको तपाईंले आफूलाई हुने सबै जोखिम र लाभहरूलाई वचिार गरेपछि तपाईं अघि बढ्न सक्नुहुन्छ । कृपया नरिणय गर्नु अघि तपाईं र तपाईंको परिवार र साथीभाईहरूलाई COVID-19 को जोखिम दुवैलाई सावधानीपूर्वक मनन गर्नुहोस् । कृपया पर्चामा दिएको तालिका हेर्नुहोस् ।

## यदि तपाईं 18 देखि 29 वर्षको स्वस्थ युवा व्यक्ति हुनुहुन्छ भने

हाल JCVI ले 30 वर्ष भन्दा कम उमेरका मानसिहरूलाई AZ बाहेक अन्य खोपहरू लगाउनु नै बेश हुन्छ भनेर सुझाव दिएको छ कनिभने COVID-19 संक्रमणको जोखिम धेरै कम छ । यदि तपाईंलाई AZ खोपको प्रस्ताव दिएको तपाईंले आफूलाई हुने सबै जोखिम र लाभहरूलाई वचिार गरेपछि तपाईं अघि बढ्न

सक्नुहुन्छ ।

## दोस्रो खुराक के हुन्छ ?

यदि तपाईंले यो दुर्लभ साइड इफेक्टबाट पडिति नभएरै पहिलो नै AZ खोपको पहिलो डोज लगाईसक्नुभएमा, तपाईंले यसको डोज पूरा गर्नुपर्छ । यसमा 18 देखि 39 वर्ष उमेरका स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाहकर्ताहरू, बनि भुक्तानी हेरचाह गर्नेहरू र प्रतिक्रिया कम भएका परिवारका सदस्यहरू समावेश छन् । खोपको पहिलो डोजले तपाईंलाई केही सुरक्षा, विशेष गरि गम्भीर रोगको वरिद्ध सुरक्षा प्रदान गरेको अपेक्षा गरिन्छ । दोस्रो डोज लएमा, त्यसले तपाईंलाई उच्च र धेरै दगिो सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ र कम साइड इफेक्टहरू (छोटो समयको लागी टाउको दुख्ने सहित) गराउने हुन्छ ।

\*यदि तपाईंलाई नशिचति दुर्लभ रगत जम्ने विकारहरू भएमा तपाईंले आफ्नो वशिषज्ञसँग AZ खोप लानि सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर छलफल गर्नुपर्छ

## खोपका लाभ र जोखिमहरू के-के हुन् ?

आयु	COVID-19 बाट जोखिम	खोपका जोखिम	खोपका फाइदा
50 वर्ष वा बढी आयुका वा अन्तर्नहिति स्वास्थ्य समस्या भएका	<p>न्यून</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संक्रमण लाग्ने</li> </ul> <p>र फैलाउने सम्भावना अत्यधिक उच्च</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अस्पतालमा भर्ना</li> <li>• इन्टेन्सिभि केयरमा भर्ना</li> <li>• मृत्यु</li> </ul> <p>मध्यम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COVID लामो समयसम्म</li> </ul>	<p>असामान्य</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पाखुरा दुख्नु</li> <li>• थकावट हुनु</li> <li>• टाउको दुख्नु</li> <li>• सामान्य दुखाइहरू</li> <li>• फ्लु जस्ता लक्षण अत्यन्तै कम</li> <li>• रगत जम्ने समस्या (1,00,000 पहिलो खुराकमा करिब 1)</li> </ul>	
40 देखि 49 वर्षको आयु	<p>उच्च</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संक्रमण लाग्ने र फैलाउने सम्भावना मध्यम</li> <li>• अस्पतालमा भर्ना</li> <li>• इन्टेन्सिभि केयरमा भर्ना</li> <li>• मृत्यु</li> <li>• COVID लामो समयसम्म</li> </ul>	<p>सामान्य</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पाखुरा दुख्नु</li> <li>• थकावट हुनु</li> <li>• टाउको दुख्नु</li> <li>• सामान्य दुखाइहरू</li> <li>• फ्लु जस्ता लक्षण अत्यन्तै कम</li> <li>• रगत जम्ने समस्या (1,00,000 पहिलो खुराकमा करिब 1)</li> </ul>	<p>एक खुराक 80% भन्दा धेरै कम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मृत्युहरू</li> <li>• अस्पतालमा भर्ना</li> <li>• इन्टेन्सिभि केयर</li> </ul> <p>दुई खुराकपछि 95% भन्दा कम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मृत्युहरू</li> </ul>
30 देखि 39 वर्षको आयु	<p>उच्च</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संक्रमण लाग्ने र फैलाउने सम्भावना कम</li> <li>• अस्पतालमा भर्ना</li> <li>• इन्टेन्सिभि केयर</li> <li>• मृत्यु</li> </ul> <p>मध्यम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COVID लामो समयसम्म</li> </ul>	<p>सामान्य</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पाखुरा दुख्नु</li> <li>• थकावट हुनु</li> <li>• टाउको दुख्नु</li> <li>• सामान्य दुखाइहरू</li> <li>• फ्लु जस्ता लक्षण अत्यन्तै कम</li> <li>• रगत जम्ने समस्या (50,000 पहिलो खुराकमा करिब 1)</li> </ul>	<p>एक खुराक 60% देखि 70% कम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संक्रमण लाग्नु र संक्रमण फैलाउनु</li> </ul> <p>दुई खुराकपछि 85% भन्दा धेरै कम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संक्रमण लाग्नु र संक्रमण फैलाउनु</li> </ul>
18 देखि 29 वर्षको आयु	<p>अत्यन्तै उच्च</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संक्रमण लाग्ने र फैलाउने सम्भावना अत्यन्तै कम</li> <li>• अस्पतालमा भर्ना</li> <li>• इन्टेन्सिभि केयर</li> <li>• मृत्यु</li> </ul> <p>मध्यम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COVID लामो समयसम्म</li> </ul>	<p>अत्यन्त सामान्य</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पाखुरा दुख्नु</li> <li>• थकावट हुनु</li> <li>• टाउको दुख्नु</li> <li>• सामान्य दुखाइहरू</li> <li>• फ्लु जस्ता लक्षण अत्यन्तै कम</li> <li>• रगत जम्ने समस्या (50,000 पहिलो खुराकमा करिब 1)</li> </ul>	

## खोप लगाएपछि मिलाे के हेरनुपर्छ ?

गम्भीर साइड इफेक्टहरू दुर्लभ भए पनि, यदि तपाईंले खोप लगाएको 4 दिन देखि 4 हप्ता सम्म नमिने मध्ये कुनै अनुभव गर्नुभएमा, तपाईंले तुरुन्तै चिकित्सा सल्लाह लनुपर्छ ।

20. नयाँ, सामान्य पेनकलिरले ठीक नगर्ने वा स्थिति अझै खराब हुँदै जाने गम्भीर रूपले दुखेको टाउको

- पल्टिदि वा झुकदा स्थिति झिन् खराब देखिने गरि दुखेको टाउको
- असामान्य गरि दुख्ने टाउको नमिनेको साथमा हुनसक्छ :
  - धमिलो दृष्टि, वाकवाकी र बान्ता
  - बोल्न गाह्रो हुने
  - कमजोरी, झुम्म हुने वा छोप लाग्ने
- नयाँ, व्याख्या गर्न नसकिने घोंच्ने डाम वा रक्तस्राव
- सांस फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने, खुट्टा सुन्ननिने वा पेटमा लगातार दुख्ने

थप जानकारीको लागि,  
[gov.je/vaccine](http://gov.je/vaccine)